Labor Chemnitz

Zentrum für Diagnostik am Klinikum Chemnitz

Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz
Tel. (0371) 333 32145
Fax (0371) 333 33440

Liquordiagnostik

TM
Sp
Auf
BA

Einsender/ Fachabteilung

Auftrags-Nr.

Eintragen, sonst keine Bearbeitung möglich!

Patienten-Etikett. Sonst unbedingt ausfüllen und markieren!

Name, Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Kostenträger

Geb.-Datum

Fallnummer

männlich
weiblich
divers

Station

Behandlungs-Art

- stationär
- teilstationär
- vorstationär
- nachstationär
- ambulant
- ambul. OP
- Begutacht.

Abrechnung

- privat
- Kassen (PK-EK)
- fremd. Einrichtung
- Berufsgenossenschaft

Abnahme

Tag

Monat

Zeit

Punkt.ort

- LP
- VP
- SOP
- Sonstiger

Beschaffenheit

- klar
- trüb
- xanthochrom
- blutig
- artefiziell blutig

Klinische Hinweise:

Unterschrift · Namensstempel verantwortl. Arzt

Materialbedarf: 7 - 10 ml Liquor / 7 - 10 ml Vollblut (Serum-Monovette)

Abnahmehinweis: Liquor in sterile Kunststoffröhrchen aufnehmen (erste Tropfen Liquor verwerfen) und numerische Kennzeichnung der Röhrchen entsprechend Reihenfolge der Entnahme.
Zusätzlich mindestens ein Polypropylenröhrchen (2 ml) für Spezialuntersuchungen bzw. PCR befüllen!

Liquor ist umgehend ins Labor zu bringen.

Bei Verdacht auf eine bakteriell bedingte Meningitis ein Röhrchen direkt in die Abteilung Mikrobiologie und telefonische Kontaktaufnahme!

Angeforderte Untersuchungen:

Grundprogramm

- 1 Zellzahl
- 2 Gesamteiweiß
- 3 Laktat
- 4 Zelldifferenzierung

Zusatzprogramm

- 5 Reiberdiagramm [1] (Berechnung der lokalen IgG-, IgA-, IgM-Synthese)
- 6 oligoklonale [1] IgG-Fraktionen (IEF)

spezielle Proteine

- 7 NSE °
- 8 Protein S-100 °
- 9 Beta-Trace-Protein
- 10

Weitere Analyte*

spezielle Proteine
1 Polypropylenröhrchen einsenden

- 11 Tau-Protein
- 12 Phospho-Tau
- 13 Ratio β-42/40 Amyloid

1 Polypropylenröhrchen einsenden

- 14 Protein 14-3-3

Achtung! 1 Liquor-Serum-Paar separat einsenden (je 1,5 ml)

- 15 Autoimmunenzephalitis-Panel
- 16 Andere:

Indirekte Erregernachweise

- 17 FSME-IgG, -IgM (im Serum)

Spezifischer AK-Index (AI) [1]

- 18 AI-Borrelia burgdorferi-IgG/M
- 19 AI-T.-pallidum (TPPA) (nach Screening im Serum)
- 20 MRZ-Reaktion (AI-Masern-, -Rubella-, -VZV-IgG)
- 21 AI-HSV-IgG
- 22 AI-VZV-IgG
- 23 andere AK-Indices:

Direkter Erregernachweis mittels PCR

1 Polypropylenröhrchen einsenden

- 24 HSV-PCR
- 25 VZV-PCR
- 26 CMV-PCR
- 27 EBV-PCR
- 28 Enterovirus RNA (PCR)
- 29 Neiss.menigitidis-PCR
- 30 Streptococcus pneum. PCR
- 31 Meningo-/Pneumo-kokken PCR

1 Polypropylenröhrchen einsenden

- 32 andere PCR: (Erreger benennen!)

[1] Liquor und Serum; * Fremdversand; ° nicht akkreditierte Untersuchung

90410220 03-2022