

Informationsbrief Nr.: 12 / 2020

Standort: Sekretariat

Pfad: QM-ZFD / Serviceprozesse / Informationsmanagement / Laborinformationen

Chemnitz, 28.12.2020

Pneumokokken-Antigentest

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

Der Pneumokokken-Antigentest im Urin besitzt nur einen geringen Stellenwert für die Diagnose. Ein negatives Ergebnis gilt nicht als Ausschluss einer Infektion mit Pneumokokken. Das Testergebnis zieht keine therapeutische Konsequenz nach sich.

Nach der aktuellen Leitlinie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie und Prävention kann der Pneumokokken-Antigentest im Urin durchgeführt werden. Er hat eine schwache Empfehlung, Evidenz C. Bei Kindern bringt dieser Antigentest in der Regel kein verwertbares Ergebnis und soll deswegen nicht durchgeführt werden.

Aus diesem Grund wird der Pneumokokken-Antigentest im Zentrum für Diagnostik eingestellt. Möchten Sie dennoch nicht auf diesen Test verzichten, kann er als Point of Care Test durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. med. G. Stamminger
Med. Geschäftsführerin



Dr.med. Marika Roch
Abteilungsleiterin Mikrobiologie